


ANEXO IV: Programa Nacional de Vigilancia Específica para *Diaphorina citri* - Actividades

Protocolo de monitoreo para el Psílido Asiático de los Cítricos (*Diaphorina citri* Kuwayama) en plantaciones comerciales




Cuadros hasta 1,5 ha.

- ✓ Determinar 5 estaciones de muestreo por cada cuadro.
1 en cada vértice (4) y 1 central
- ✓ En cada estación seleccionar 10 árboles al azar.
- ✓ En cada árbol realizar 3 golpes sobre una rama, ubicando previamente (altura adecuada) la tabla para el conteo de los psilidos inmediatamente que estos caigan sobre la misma.

Para cada estación se anotará en la planilla:

- la suma de los psilidos resultantes del tap de cada árbol.
- la presencia de brotación discriminando en: nula, baja y alta.
- la presencia de huevos y ninfas.

Cuadros hasta 1,5 has



Cuadros hasta 1,5 has

- Se ubicarán 5 sitios por ha: en el centro y los 4 vértices.
- En cada sitio, ubicado el monitoreador en la entrefila, se trabajará sobre 4 puntos cardinales de las plantas más cercanas.
- En cada punto cardinal:
 - se realizarán 3 golpes sobre una rama.
 - observación visual (1 minuto).

