

SISTEMA
GANADERO
EXTENSIVO

Medidas para un preparto exitoso

Diagnóstico de gestación

Ecografía

¿Cuándo hacerla? 30 a 60 días de retirados los carneros.

Información que brinda	Utilidad
Carga fetal	Permite atender melliceras, borregas y ovejas gestantes en mala condición
Fecha probable de parto	Lotes de parición
Preñada o fallada	Separación de ovejas falladas

Condición corporal

La condición corporal (CC) de la oveja al parto determina el peso al nacer del cordero y su sobrevivencia.

Es necesario que las ovejas lleguen al parto con una CC entre 3 y 3,5 para obtener:

- Pesos del cordero al nacer de 3,5 a 4 kg.
- Mayor producción de leche en las ovejas.


Esquila pre parto

Condiciones

- Al menos 30 días previo al parto.
- Uso herramientas de protección, peines altos (Cover o R13), capas o abrigos.
- Es importante que las ovejas estén en CC de 3 a 3,5, de no ser así es aconsejable apartar las de menos de 3 y pasarlas a un plano de alimentación que las ayude a lograr esa condición.
- Independientemente de la CC, es importante que luego de la esquila las ovejas accedan a pasturas de buena disponibilidad y/o suplementos.

Beneficios

- Mayor sobrevivencia de corderos.
- Facilidades en el manejo.
- Sincronización bajada de leche - parto.
- Menor cantidad de ovejas caídas, menor toxemia y mortandad.



SISTEMA
GANADERO
EXTENSIVO

Manejo nutricional

Disponibilidades recomendadas para ovejas gestantes

Tipo de pastura	Rango en cm
Campo Natural	5 – 8
Campo Mejorado	4 – 7

Suplementación

Condiciones

- Las ovejas deben saber consumir concentrado previamente.
- Realizar un periodo de acostumbramiento gradual al suplemento de 10 – 15 días y luego pasar a un consumo total de no más de 1% del peso vivo de la oveja.
- Iniciar el consumo total por lo menos una semana antes de la parición.
- Suplementos altos en energía.

Beneficios

- Mayor producción de calostro.
- Calostro más líquido, lo cual facilita su consumo.

Sanidad

- Monitoreo mensual con HPG desde la ecografía.
- Reserva de potrero para parición: 60 días sin pastoreo ovino.
- Dosificación estratégica preparto ("Toma") utilizando droga de alta eficacia. Consulte a su veterinario de confianza para definir los principios activos. Aplicar antes de ingresar al potrero reservado.
- Vacunación clostridiosis. Si se usan pasturas mejoradas o concentrados para mejorar la CC de las ovejas, la vacuna debe ser administrada antes de estos manejos.
- Libres de afecciones podales y ectoparásitos.

