

SISTEMA GANADERO EXTENSIVO




Recomendaciones durante el entore

Es muy importante recorrer frecuentemente el rodeo de cría y verificar la actividad de los toros, para poder identificar posibles problemas y corregirlos a tiempo.

Recordamos algunos puntos a tener en cuenta durante el entore:

- 1 Luego de distribuir los toros en los diversos rodeos, verificar que cada toro pertenezca al rodeo al que fue asignado.
- 2 Identificar si hubiera algún toro agresor para sacarlo del rodeo.
- 3 Verificar que sean capaces de identificar grupos de hembras con actividad sexual.
- 4 Controlar la monta para reconocer problemas que puedan alterar su servicio (problemas en las patas, dificultades de visión, bicheras, alteraciones en el aparato reproductor) o problemas sociales, como la dominancia, lo que impide a ciertos toros cumplir con el servicio.
- 5 Hacer trotar a los toros con cierta frecuencia para observar si tienen alguna claudicación debida a problemas de patas o pezuñas.
- 6 Observar si aparecen lesiones en prepucio, pene o testículos.
- 7 Controlar el estado corporal de los toros.
- 8 En el caso de observar alguno de estos problemas, retirar el toro y reponerlo al servicio una vez que se solucione.
- 9 En potreros extensos, de monte y/o sierra es conveniente juntar el rodeo con los toros en una aguada, de ser posible todos los días. Esto permite que los toros encuentren más fácilmente a las vacas en celo.



**SISTEMA
GANADERO
EXTENSIVO**

10 No es conveniente rotar los toros. Siempre empezar con el porcentaje asignado y retirar los toros todos juntos.

Un toro puede ser subfétil durante períodos de una a cuatro semanas después de situaciones de estrés producidas por calor, fiebre o enfermedades agudas. Por eso se recomienda la supervisión frecuente del comportamiento de los toros para retirar a los que presenten problemas y permitir su recuperación antes de retornar al servicio.



Durante los meses en que los toros están en descanso sexual, deben permanecer en potreros con disponibilidad forrajera tal, que se mantengan en buen estado nutricional. Un error frecuente es acordarse de los toros poco tiempo antes de comenzar el servicio. Los reproductores deben comenzar la actividad con un estado corporal correcto, ni muy gordos ni muy flacos, cuidando que la pérdida de condición corporal durante el entore sea mínima.