



SISTEMA
GANADERO
EXTENSIVO

Parición: qué mirar, qué registrar y qué decidir

La parición es un suceso de gran importancia que debe controlarse. Las vaquillonas son la categoría que demanda mayor cuidado, por lo que se recomienda que permanezcan cerca del casco para poder recorrerlas con frecuencia ante posibles problemas al parto: atraques o requerimientos de ayuda extra en el nacimiento de sus terneros.

Además, por el hecho de ser animales que presentan anestros más largos, con la consecuente dificultad para volver a preñarse, deberán parir en muy buen estado corporal. Otra alternativa es que paran en algún mejoramiento de campo o potrero reservado, de forma de evitar bruscas caídas de condición corporal o producción de leche por debajo de lo potencialmente esperado. Una buena asignación de forraje después del parto ayudará en su recuperación posterior y de esta forma se incrementan las probabilidades de que entren en celo más temprano.

Es importante identificar el momento del parto. Esto no quiere decir entrar en la complejidad de registrar nacimientos diarios, pero si poder identificar mes de nacimiento o, al menos, punta y cola. Esto es de gran ayuda a la hora de organizar el entore, asignando animales a diferentes manejos.

En el rodeo general, también es importante observar el estado corporal en que las vacas paren. Si se detectan vacas en baja condición corporal, deberán trasladarse a un potrero de mayor cantidad y calidad de pasturas. Si no existen suficientes potreros para este manejo, podrán incorporarse al lote de vaquillonas de primera cría y manejarse como un lote solo que será prioritario desde el punto de vista nutricional.

En resumen ¿qué hay que mirar, registrar y decidir?

Mirar cuidadosamente las vaquillonas de primer parto y asistirles en caso de ser necesario. Mirar el estado corporal de las vacas al parto, tanto las primíparas como las multíparas, y decidir un manejo diferencial alimenticio para aquellas en mal estado. Registrar el momento del parto dentro de la estación de partos, al menos en parición temprana y tardía.