

SISTEMA GANADERO EXTENSIVO



Destete precoz

Consideraciones generales

El destete precoz consiste en la separación definitiva del ternero de la vaca a una edad tal en la que el ternero no vea afectado su desarrollo.

Al sacarle el ternero, la vaca disminuye sus requerimientos lo que le permite una rápida mejora en su estado. Además, al suprimir el efecto inhibitorio que tiene el amamantamiento sobre la ovulación, las vacas quedan en condiciones de presentar celos en un periodo relativamente breve

¿Cuándo hacerlo?


- El destete precoz es recomendable hacerlo en vacas de primera cría, en vacas adultas de bajo estado corporal (menor a 3,5), en vacas paridas muy tarde o que están en anestro profundo durante el entore.
- Se requiere que los terneros tengan al menos 2 meses de edad y un peso mínimo de 70 kilos para que se adapten a la nueva alimentación que sustituye a la leche.
- Se debe realizar al menos 30 días antes de que concluya el entore para que tenga efecto.

Etapa de corral:

Al separarlos de sus madres los terneros se llevan a un corral. Esta etapa dura aproximadamente 10 días y en ella los animales son alimentados con una ración con 18 % de proteína. La cantidad de ración se debe ir aumentando paulatinamente (desde el día 1 al 10) hasta llegar a un consumo de 1 kg diario por animal.

El agregado de fardos de calidad en la dieta ayuda en esta etapa. Se debe dar a razón de 500 gramos de fardo por día por ternero.

Otro aspecto fundamental es la atención sanitaria de los terneros destetados, ya que pueden padecer un descenso en sus defensas debido al estrés por la separación de su madre y al cambio de alimentación.



SISTEMA GANADERO EXTENSIVO

Se deben atender los problemas de queratoconjuntivitis, diarreas, clostridiosis y parasitosis, por lo que se recomienda vacunar a los terneros al pie de la madre contra queratoconjuntivitis y clostridiosis (aproximadamente 21 días antes de hacer el destete) y revacunarlos (2ª dosis) antes de realizar el mismo.

¿Es posible aplicar todas estas vacunas al mismo tiempo? La respuesta es Sí para las vacunas inactivadas (Clostridiosis, Neumoenteritis, Queratoconjuntivitis). Es recomendable espaciar en el tiempo la aplicación de la vacuna de Carbunco, ya que como es una vacuna viva, puede ocasionar un leve aumento de la temperatura pudiendo interferir en la respuesta inmunitaria a los otros antígenos.

El cuidado de la sanidad es muy importante ya que se trabaja con animales que no tienen un sistema inmunitario totalmente desarrollado, que sufren un estrés importante al ser sometidos a este manejo y, además, en la etapa de corral están en estrecho contacto, aumentando las posibilidades de contagio.

Una vez concluida la etapa de corral, los terneros deben realizar un periodo de adaptación con una alimentación mixta con la ingesta de ración y pasturas.

Etapa de campo

Una vez finalizada la etapa de corral, los terneros se llevan al campo, donde se les continúa dando ración, por un periodo que depende del peso de los animales y de la pastura ofrecida. Ese periodo es normalmente de entre 90 y 100 días

La cantidad de ración a suministrar va desde 1 a 1,5% del peso vivo de los animales por día y es conveniente ofrecerla siempre a la misma hora. Debe suministrarse ración balanceada con al menos 16 % de proteína.

El momento en que se deja de suministrar ración depende de la disponibilidad y calidad de la pastura que se tenga para los terneros.

El mayor impacto en la aplicación de destete precoz se logra con:

- vacas de segundo entore,
- vacas con una condición corporal cercana a 3 y
- vacas cola de parición.

En estos casos los aumentos de preñez esperados oscilan entre 30 y 70 puntos porcentuales.