

Calandria (Mimus saturninus)

Orden: Passeriformes

Familia: Mimidae

Ing. Agr. Oscar Blumetto

DESCRIPCIÓN

Tiene un largo total de 21 cm con un color dorsal gris a pardo oscuro estriado, con pequeñas líneas blancas dado el color del borde de las cobertoras alares. El pecho es de color ceniciento y posee una “vincha blanca y un antifaz negro”; pico y patas son negras y al volar se puede apreciar una banda blanca a ambos lados.

HÁBITAT Y COMPORTAMIENTO

Es un ave relacionada a ambientes típicos de nuestro campo, praderas, monte parque e incluso jardines. No es de extrañar su presencia en cercanías de construcciones humanas, posada sobre antenas, cables, alambrados y en ocasiones “robando” trozos de carne u otros alimentos de casas de campo o el plato del perro.

Su canto es muy variado e inclusive llega a imitar a otras aves de donde proviene su nombre Mimus. Sin embargo tiene algunas “partituras” más típicas.

Generalmente tiene un territorio restringido dentro del cual se desplaza en parejas o muy pequeños grupos que en general se conforman con los juveniles nacidos ese año.

Su vuelo es bastante lento y su cola se despliega en forma de abanico dando la apariencia de ser muy pesado.

ALIMENTACIÓN

Su alimentación se basa fundamentalmente en insectos, algunas semillas y frutos pequeños. En ocasiones puede actuar como carroñero es decir picotear sobre la carne de animales para sacar pequeños trozos pero en general solo lo hace con carne fresca y no con cierto grado de descomposición lo cual es tarea de otras especies.

REPRODUCCIÓN

Se reproduce en primavera-verano, nidifica a baja altura siendo su nido una plataforma de ramas mas o menos gruesas con una taza interior de material más fino al que pueden agregar hilos, trozos de lana, plumas etc. Ambos integrantes de la pareja son encargados de la custodia del nido al cual defienden “con mucho ímpetu”. Según mis observaciones se alternarían también en el trabajo de incubación.



FOTO: EDISON BIANCHI

UBICACIÓN Y STATUS EN LAS BRUJAS

En la Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”, INIA Las Brujas la podemos ver principalmente en los alrededores del edificio central y en todos aquellos lugares donde existe pradera abierta con algunos árboles aislados o en pequeños grupos. Es un residente abundante.



FOTO: OSCAR BLUMETTO

Cardenal copete rojo (*Paroaria coronata*)

Orden: Passeriformes

Familia: Emberizidae

Subfamilia: Cardinalinae

Ing. Agr. Oscar Blumetto

DESCRIPCIÓN

Ave mediana entre los pájaros (19 cm). Dorso gris plumizo a acerado y vientre blanco puro. Garganta, mejillas, frente y prominente copete de color rojo, este último puede encontrarse más o menos erecto según la actividad o grado de excitación del individuo. Pico corto, fuerte, de color gris y con maxilar superior sobresaliendo levemente sobre el inferior.

HÁBITAT Y COMPORTAMIENTO

Es un residente bastante común en todo el país con una población más densa en la zona del litoral oeste y presencia escasa en las sierras del este. Habita fundamentalmente ambientes abiertos con presencia de árboles dispersos o islas de árboles. En el litoral oeste es más frecuente verle en zonas de chacras con escasos árboles, aunque siempre en la cercanía de algún matorral o gran árbol aislado. En la zona centro-sur y norte del país donde hay grandes extensiones de pradera natural, se concentra en los arbolados de estancias o casas rurales. Raramente se encuentra en el monte denso y ocasionalmente en sus bordes. Lo mismo sucede en forestación de eucalipto donde habita los bordes o islas pequeñas de árboles maduros. Suele vivir en parejas con territorios más o menos grandes según la oferta de alimento, principalmente en la época reproductiva. En invierno puede formar grandes bandos en especial en el litoral oeste y más pequeños en el resto del territorio que en general están compuestos por la pareja y los pichones de la temporada anterior.

ALIMENTACIÓN

Su alimentación se basa en semillas, con una muy marcada preferencia hacia aquellas que han caído al suelo. También consume insectos y otros invertebrados terrestres. Puede consumir frutos pequeños y brotes tiernos de árboles o hierbas.

REPRODUCCIÓN

Se reproduce en primavera – verano, encontrándose la mayoría de los nidos desde septiembre a febrero. Nidifica en árboles a mediana altura, talas, coronillas y molles preferentemente, aunque es muy versátil pudiendo utilizar muchas especies, incluso exóticas, donde muestra bastante afinidad por cipreses y eucaliptos. Su nido es una tasa muy bien formada en su interior e irregular en el exterior, esta



FOTO: EDISON BIANCHI

construida con ramitas en la base y hierbas finas y cerdas de animales en el interior. El nido se apoya generalmente en horquetas de ramas paralelas al piso.

STATUS

Es un residente común (Aspiroz, 2001). Residente abundante en el litoral del Río Uruguay y común al norte (Rocha, 2003). En INIA las Brujas su presencia es habitual en zonas de hábitat propicio, observándose desde 2006 la formación de bandos invernales de unos 30 ejemplares. En INIA La Magnolia no constatamos su presencia, sin embargo hay relatos de su presencia años atrás en el parque circundante al casco, su desaparición es atribuida a la presión de caza que ha sufrido en los alrededores de la ciudad de Tacuarembó.



FOTO: OSCAR BLUMETTO

BIBLIOGRAFÍA

AZPIROZ, A. (2001) Aves del Uruguay: Lista e introducción a su biología y conservación. Aves Uruguay-Gupeca . Montevideo.
 ROCHA, G. (2003) Aves del Uruguay: País de los pájaros pintados.