

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO ENERO 2025

ÍNDICE DE VEGETACIÓN (NDVI) - PRECIPITACIONES - PORCENTAJE DE AGUA DISPONIBLE (PAD) ÍNDICE DE BIENESTAR HÍDRICO (IBH) - AGUA NO RETENIDA (ANR) - PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS

Año XX — Nro. 01

Síntesis de la situación agroclimática de enero

En base a la estimación, monitoreo y análisis que realiza el GRAS del INIA de las variables agroclimáticas: precipitaciones, porcentaje de agua en el suelo, índice de bienestar hídrico e índice de vegetación, se puede apreciar que el estado hídrico "promedio" de los suelos durante el mes de enero mostró condiciones de perfil con valores estimados de contenido de agua en el suelo (porcentaje de agua disponible, PAD) de entre 10% y 50%. Los valores estimados de PAD fueron inferiores a los que se podrían esperar en este mes para gran parte del país, siendo iguales en zonas puntuales de la región centro y este. Las precipitaciones acumuladas variaron promedialmente entre 20mm y 125mm, registrándose valores inferiores a los esperables para este mes del año en prácticamente todo el país con valores iguales o superiores en zonas puntuales, principalmente en la región centro. En cuanto al estado de la vegetación, es variable en el espacio. Se observaron valores de NDVI iguales o superiores a los esperados para enero en prácticamente todo el territorio, con algunas zonas donde éstos fueron inferiores, principalmente en el norte y en el sur.

Perspectivas climáticas trimestrales elaboradas por el IRI de la Universidad de Columbia


De acuerdo a las perspectivas climáticas elaboradas por el IRI para las precipitaciones acumuladas en el trimestre Febrero-Marzo-Abril en conjunto, se estiman mayores probabilidades (40%) de que estén por debajo de lo normal en gran parte del país. En la zona norte y parte del litoral oeste, no se estiman sesgos entre los terciles (iguales probabilidades de que las lluvias estén por debajo, igual o por encima de lo normal).

Para la temperatura media del aire y analizando ese mismo trimestre, se estiman mayores probabilidades (40%-45%) de que las temperaturas estén por encima de lo normal en todo el territorio.

Más información puede encontrarse en el sitio del IRI: http://www.iri.columbia.edu




Porcentaje de agua disponible (PAD)




El porcentaje de agua disponible en el suelo (PAD) se define como: (ADI/APDN)*100, donde ADI es la cantidad de agua en el suelo y APDN el agua potencialmente disponible neta en ese suelo.

En términos muy generales se consideran umbrales críticos de porcentaje de agua en el suelo, valores por debajo de 40-50% en cultivos extensivos y valores por debajo de 30-40% en pasturas.

El estado hídrico <u>promedio</u> de los suelos en el mes de enero (figura superior) fue de contenido de agua en el perfil con valores estimados de PAD de entre 10% y 50% en todo el país.






Se define como anomalía mensual a la comparación entre el valor de porcentaje de agua disponible en el sue-lo (PAD) para un mes dado contra la media para dicho mes, considerando una serie histórica de 20 años (2000 -2019). Los valores negativos, representados con colores amarillo, naranja y rojos, significan registros por debajo del promedio histórico estimado para ese mes. Tonos de verde representan registros superiores.





Agua no retenida (ANR)




Otra salida del modelo de balance hídrico es el Agua no retenida en el suelo, la cual se define como la suma del <u>Escurrimiento superficial</u> y <u>Excesos de agua</u> en el suelo (Agua que excede el contenido de agua del suelo a capacidad de campo).

Como se puede observar en el mapa, para el mes de enero, se estimaron volúmenes de agua excedente (tonos de verde azulado), en zonas puntuales del territorio (principalmente en el centro), con máximos de hasta 60mm.

Índice de bienestar hídrico (IBH)

El IBH resulta de la relación entre la transpiración real (estimada por el modelo de balance hídrico nacional) y la demanda potencial (ETR/ETP). Valores cercanos a 100% indican que la vegetación se encuentra en valores de transpiración cercanos a la demanda potencial. Por el contrario valores de IBH cercanos a 0% indican que la vegetación se encuentra en valores de transpiración muy por debajo de la demanda potencial, indicando que climatológicamente la vegetación se encuentra bajo stress hídrico. En general se considera que valores de índice de bienestar hídrico por debajo de 50% indican condiciones de estrés en la vegetación.




Como se observa en la figura, el índice de bienestar hídrico <u>promedio</u> estimado en enero presentó valores de entre 20% y 60% en todo el país.





Precipitaciones ilia URUGUAY > 550 500 - 550 31°S 450 - 500 400 - 450 350 - 400 300 - 350 250 - 300 200 - 250 32°S **150 - 200** 100 - 125 75 - 100 50 - 75 25 - 50 33°S 0 - 25 Como se observa en la figura, las precipitaciones acumuladas durante todo el 34°S mes de enero variaron "promedialmente" entre 20 y 125mm. 54°W 58°W 57°W 56°W 55°W 53°W



En el mapa de "anomalías" se puede observar que los valores de precipitación registrados fueron inferiores a los esperados para este mes del año (tonos de rosa) en prácticamente todo el país, estimándose valores iguales o superiores (color crema y tonos de verde) en zonas puntuales, principalmente en la región centro.


Comparación en base a la mediana calculada para este mes, considerando el período 1961-2009.

Se define como anomalía mensual a la diferencia entre el valor de precipitación actual menos el valor de la mediana (percentil 50%) histórica. Los valores negativos, representados con colores rojos, significan registros por debajo de la normal o del valor histórico esperado para el período. Tonos de verde representan registros superiores a la normal





Índice de vegetación (NDVI)




Los valores registrados del índice de vegetación para el mes de enero fueron iguales o superiores a los esperables para este mes del año en prácticamente todo el país, con algunas zonas donde éstos fueron inferiores, principalmente en el norte y en el sur.

El índice de vegetación diferencia normalizada, NDVI o IVDN, es una variable que permite estimar el desarrollo de la vegetación en base a la medición, con sensores remotos satelitales, de la intensidad de la radiación de ciertas bandas 53°W del espectro electromagnético que la misma emite o refleja.

Los valores de NDVI oscilan entre -100 y 100. El índice permite identificar la presencia de vegetación verde en la superficie y caracterizar su distribución espacial así como la evolución de su estado a lo largo del tiempo. Como referencia:

- Agua: valores negativos de NDVI.
- Suelo descubierto y con vegetación rala, seca, o bajo estrés: valores positivos no muy elevados.
- Vegetación densa, húmeda, sana o bien desarrollada: presenta los mayores valores.

Estas diferencias se pueden apreciar en la imagen de la derecha donde figuran los desvíos de los valores de este mes respecto al promedio de los meses de enero de la serie histórica 2000-2024. Los colores indican rangos de % de desvío en relación a la media de esa serie histórica (la que se considera en el rango –10 y 10, color gris), representándose en amarillo los valores inferiores al promedio y en tonos de verde, los superiores.






Perspectivas climáticas feb-mar-abr elaboradas por el IRI de la Universidad de Columbia

Para el trimestre Febrero-Marzo-Abril y en relación a las precipitaciones acumuladas en ese trimestre en conjunto, estiman mayores probabilidades (40%) de que estén por debajo de lo normal en gran parte del país. En la zona norte y parte del litoral oeste, no se estiman sesgos entre los terciles (iguales probabilidades de que las lluvias estén por debajo, igual o por encima de lo normal).

Para la temperatura media del aire y para el mismo trimestre, se estiman mayores probabilidades (40%-45%)

IRI Multi-Model Probability Forecast for Precipitation for IRI Multi-Model Probability Forecast for Temperature for February-March-April 2025, Issued January 2025 February-March-April 2025, Issued January 2025



Destacamos para este mes

INIA Termoestrés

Previsión de condiciones ambientales que causan estrés calórico en bovinos de carne y leche.

link directo

Consultas y comentarios a: gras@inia.org.uy





